

Dale®

수술 후 브라

착용 방법

1. 띠를 분리하고 브라를 환자 밑에 놓아두십시오.
2. 브라의 양쪽을 꼭 잡고 함께 누르십시오. 약간의 팽팽함이 있어야 합니다.
3. 띠를 밴드의 상단에서 브라의 앞면에 붙이십시오.
4. 브라는 앞면과 띠에서 파스너를 벗겨 내어 쉽게 조절할 수 있습니다.



대안 착용법

Dale 수술 후 브라는 띠를 분리하지 않고 환자의 팔을 띠를 통해 살짝 빠져나가게 하여서도 사용할 수 있습니다.

세탁 및 관리



세탁기를 사용하여 온수로 세탁하십시오.



빨랫줄 건조.



표백제 사용 금지.



다림질 금지.



드라이클리닝 금지.

단일 환자용. 1회용

도포 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale®은 미국과 유럽연합에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.

Dale Medical Products, Inc.
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany (독일)

